

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたのでご案内を致します。
何卒ご理解ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

- 変更実施日：2026年3月31日（火）ご依頼分より
- 変更内容：検査内容の変更（試薬・測定方法変更等の為）

| コード | 検査項目名 | | 新 | 旧 |
|------|--------------------------------|------|--------------------------------|--|
| 1360 | プロテインC活性 | 基準値 | 82 ~ 112 % | 70 ~ 140 % |
| 3964 | 単純ヘルペスウイルスDNA定量 | 基準値 | 血液：2.0×10*1未満 髄液：1.0×10*2未満 | 血液：2.0×10*1> 髄液：1.0×10*2> |
| 3887 | ヒトヘルペスウイルス6型 DNA定量 | 基準値 | 血液：2.0×10*1未満 | 血液：2.0×10*1> |
| 2203 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 〈尿〉 | 測定方法 | ECLIA法 | FEIA法 |
| | | 基準値 | 3.0 mIU/mL以下 《裏面参照》 | M 2.5 mIU/mL以下 F(非妊婦) 2.5 mIU/mL以下 |
| 2821 | ループスアンチコアグラント 《希釈ラッセル蛇毒試験法》 | 基準値 | dRVVT比 1.2 以下 | 1.2 以下 (Normalized Ratio) |
| 2824 | ループスアンチコアグラント 《リン脂質中和法》 | 基準値 | SCT比 1.16 以下 | SCT比 1.16 未満 |
| 2013 | サイログロブリン(Tg) | 測定方法 | CLIA法 | ECLIA法 |
| | | 基準値 | 3.68 ~ 64.15 ng/mL | 33.7 以下 ng/mL |
| 2313 | TSHレセプター抗体定量 (TRAb定量) | 測定方法 | CLIA法 | ECLIA法 |
| | | 基準値 | 3.10 未満 IU/L | 2.0 未満 IU/L |

お問い合わせ 株式会社CIS 熊本中央研究所
TEL(096)284-1381

ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 〈尿〉


基準値比較

| | | 新法 | | 旧法 | |
|--------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 血清 (mIU/mL) | 尿 (mIU/mL) | 血清 (mIU/mL) | 尿 (mIU/mL) |
| 男性 | | 1.0 未満 | 3.0 以下 | 1.0 以下 | 2.5 以下 |
| 女性 | | 5.0 以下* | | 1.0 以下 (非妊婦) | 2.5 以下 (非妊婦) |
| 妊婦 | 3週 | 5.4~72 | 未設定 | 4,700~87,200 | 1,100~62,600 |
| | 4週 | 10.2~708 | | | |
| | 5週 | 217~8,254 | | | |
| | 6週 | 152~32,177 | | | |
| | 7週 | 4,059~153,767 | | | |
| | 8週 | 31,366~149,094 | | | |
| | 9週 | 59,109~135,901 | | 6,700~202,000 | 1,800~191,000 |
| | 10週 | 44,186~170,409 | | | |
| | 12週 | 27,107~201,615 | | | |
| | 14週 | 24,302~93,646 | | 13,800~68,300 | 3,100~125,000 |
| | 15週 | 12,540~69,747 | | | |
| | 16週 | 8,904~55,332 | | | |
| | 17週 | 8,240~51,793 | | | |
| 18週 | 9,649~55,271 | | | | |
| 21~40週 | — | 4,700~65,300 | 1,400~29,400 | | |

*：健常者女性を対象としています。閉経後は10mIU/mLまで上昇する場合があります。

相関

[尿]



お問い合わせ 株式会社CIS 熊本中央研究所
 TEL(096)284-1381